

Suomen Pyreneläiset ry

Jalostussuositukset lk/pk pyreneittenpaimenkoiralle

1. Sairaudet: Rodussa todetut sairaudet tulee huomioida jalostuksessa siten, että pyritään estämään niiden lisääntyminen. Mahdollisesti perinnöllistä sairautta mm. epilepsia, autoimmuunisairauksia ja sydänsairauksia sairastavia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Koiria, joille on mahdollisesti perinnöllisen vian/sairauden vuoksi tehty eläinlääketieteellinen toimenpide, tai jotka tarvitsevat säännöllistä lääkitystä tai erityisruokavaliota, ei tule käyttää jalostukseen.
2. Ikävaatimukset: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulisi olla vähintään 24 kuukauden ikäisiä.
3. Lonkat: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulisi olla virallisesti lonkkakuvattuja. Jalostukseen käytettävän lyhytkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran lonkkatutkimuksen tulos voi olla korkeintaan C. Jalostukseen käytettävän pitkäkarvaisen pyreneittenpaimenkoiran lonkkatutkimuksen tulos voi olla korkeintaan D. D-lonkkaista käytetään kuitenkin vain harkiten. C- tai D-lonkkaisen koiran pariaksi tulee valita koira, joka on lonkkakuvattu tuloksella A tai B.
4. Kyynärät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulisi olla virallisesti kyynärtutkittuja. Jalostukseen käytettävän koiran kyynärtutkimuksen tulos saa olla korkeintaan 1/1. Tällöin toisen osapuolen tulee olla kyynäriltään 0/0.
5. Polvet: Pentueen vanhemmilla tulisi olla astutushetkellä voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto. Jalostukseen käytettävän koiran polvitutkimuksen tulos saa olla korkeintaan 1/1. Tällöin toisen osapuolen tulee olla polvitutkimustulokseltaan 0/0.
6. Selkä: jalostukseen käytettävät koirat tulisi selkäkuvata virallisesti. Tulos saisi olla korkeintaan LTV1/VA1/SP1. Mikäli selkäkuvauksen tulos on muu kuin LTV0 (normaali), VA0 (normaali), SP0 (puhdas), tulisi toisen osapuolen olla LTV0 /VA0 /SP0.
7. Silmät: Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulisi olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. Koirien tulisi olla myös pentupeilattu ennen 10 viikon ikää.
8. Läheinen sukusiitos: Pentueen sukusiitosasteen tulisi olla alle 6,25 % laskettuna 5:llä sukupolvella.
9. Geenipoolin säilyttämiseksi kasvattajien tulisi käyttää rodun yksilöitä mahdollisimman laajasti ja kattavasti jalostukseen. Jotta rodun perimä ei kaventuisi liikaa, tulee kunkin yksilön jalostuskäyttöä harkita tarkoin. Jalostuksessa on turvattava rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Rodun eri yksilöitä tulee käyttää jalostukseen monipuolisesti.
10. Jalostukseen käytettävällä pyreneittenpaimenkoiralla tulisi olla vähintään 18 kk iässä saavutettu näyttelytulos, joka on vähintään H (hyvä). Hyväksytty tai ehdoin hyväksytty jalostustarkastus korvaa näyttelytuloksen.

Hyväksytty Vuosikokouksessa 2023